

Seznam hub na poznávačku (Bi)


nádorovka kapustová (*Plasmodiophora brassicae*)

- hlavní znaky – působí nádorovitost košťálové zeleniny, hypertrofii kořenů a následný úhyn




plíseň hlavičková (*Mucor mucedo*)

- hlavní znaky – vyskytuje se na špatně uskladněných potravinách







Mucor




štětíčkovec (*Penicillium*)

- hlavní znaky - tvoří zelenošedé povlaky na pečivu




kropidlák (*Aspergillus*)

- hlavní znaky – měchýřkovitě rozšíření na konci, produkce aflatoxinů, org. kyselin



padlí travní (*Erysiphe graminis*)

- hlavní znaky – obligátní parazité



paličkovice nachová (*Claviceps purpurea*)

- hlavní znaky – z námele se tvoří LSD



hlízenka (*Monilia*)

- hlavní znaky – způsobuje hnilobu ovoce,



smrž (*Morchella*)

- hlavní znaky – vřeckovýtrusá houba




ucháč (*Gyromitra*)

- hlavní znaky – kozlovitě zprohýbaný klobouk



lanýž (*Tuber*)

- hlavní znaky – roste pod zemí



sněť kukuřičná (*Ustilago maydis*)

- hlavní znaky – deformuje kukuřičný klas



dřevomorka (*Serpula*)

- hlavní znaky – ničí dřevo



hřib smrkový (*Boletus edulis*)

- hlavní znaky – hnědý klobouk, světlé póry, světlý třen se síťkou a bílou dužninou nemění se na řezu



hřib hnědý (*Boletus badius*) „lidově modrák, suchohřib“

- hlavní znaky – roste na sušších místech



hřib kovář (*Boletus erythropus*)

- hlavní znaky - smrkové a bukové lesy, od koloděje se liší červenými zrníčky na žlutém podkladě třeně -> červené zrnění. Modrá. (Koloděj je opatřen síťkou)



hřib koloděj (*Boletus luridus*)

- hlavní znaky - většinou se vyznačuje výraznou síťkou po celém tření. Modrá.



hřib satan (*Boletus satanas*)

- hlavní znaky - má světlejší (bělavě až stříbřitě šedý) povrch klobouku, kdežto spodní část (rourky) je oranžově červená. Rovněž noha (třeň) je na žlutém podkladě opatřena drobnější červenavou síťkou, tedy drobnými očky, které jsou dobře vidět pod lupou. Na řezu plodnice mírně zmodrá.



hřib žlučník (*Boletus felleus*) „lidově hořčák“

- hlavní znaky - břichatý třeň s výraznou síťkou, bílými, postupně až narůžovělými rourkami a hořkou dužninou.



křemenáč osikový (*Leccinum rufum*)

- hlavní znaky – roste pod osikami na krajích lesa, podobné druhy (krvavý, březový,..) se často zaměňují



holubinka vrhavka (*Russula emetica*)

- hlavní znaky holubinek – pórovitá a zrnitá dužina (podobná jablku), je-li po ochutnání dužina hořká, je nejedlá (až jedovatá), je-li chutná, je jedlá
- hlavní znaky - středně velké plodnice, bílý křehký třen s červenou barvou klobouku, čistě bílé lupeny, značně palčivá, bílá dužnina a ovocná vůně. Roste především v jehličnatých lesích, s oblibou v mechu.



holubinka nazelenalá (*Russula virescens*)

- hlavní znaky - mírně chutnající druh s políčkovitě rozpraskaným kloboukem, pod listnáči



muchomůrka šedivka (*Amanita spisa*)

- hlavní znaky – jedlá, nevalné chuti, na okraji nerýhovaný klobouk a na svrchní straně podélně rýhovaný prsten !pozor na záměnu s m. tygrovanou!



muchomůrka růžovka (*Amanita rubescens*) „lidově masák“

- hlavní znaky - na okrajích je patrné jemné rýhování, na povrchu je kryt četnými drobnými stroupky rozmanitého tvaru (zbytky vela), převážnou část pokožky masáka lze snadno sloupnout



muchomůrka tygrovaná (*Amanita pantherina*)

- hlavní znaky - jedovatý druh s hnědě zbarveným kloboukem, rýhovaným okrajem a hladkým prstenem!



muchomůrka zelená (*Amanita phalloides*)

- hlavní znaky – Protože patří pravděpodobně mezi vůbec **nejjedovatější houby** na světě, napíšu sem toho trochu víc.. Klobouk je zprvu klenutý, později až téměř plochý, lesklý a barevně dosti variabilní. Může být téměř čistě bílý, světle, tmavě, či olivově zelený, žlutozelený nebo dokonce zelenohnědý, není opatřen stroupkou (zbytky vela), jak je tomu například u muchomůrky červené, lupeny jsou volné a bílé, třeně válcovité, bělavé, někdy zelenohnědě melírované, s poměrně výrazným bílým, blanitým prstenem, který může být jak hladký, tak rýhovaný, na bázi je rozšířený a je opatřený výraznou bělavou pochvou, nazývanou dosti výstižně **kalichem smrti**, dužnina je bílá a páchne po syrových bramborách.



bedla (*Lepiota*), bedla vysoká (*Macrolepiota procera*) na obrázcích

- hlavní znaky - typický šupinatý klobouk a žíhaný třeň, běžně v listnatých lesích



václavka (*Armillaria*)

- hlavní znaky - častý rezavě zbarvený trsnatě rostoucí druh s šupinkami a masově zbarvenými lupeny, ničí stromy



ryzec pravý (*Lactarius deliciosus*)

- hlavní znaky – klobouk a třeň je zbarven červeno-oranžově s tmavšími soustřednými kruhy, stářím zelená. Povrch je lepkavý s ostrým a dlouho podvinutým okrajem. Mléko je oranžové, na vzduchu netmavne.



ryzec černohlávek (*Lactarius lignyotus*)

- hlavní znaky – hnědočerná až černá houba, s bílými lupeny a lososově červeným mlékem



ryzec syrovinka (*Lactarius volemus*)

- hlavní znaky – jedlý, (i za syrova) s hnědnoucím mlékem



hnojník (*Coprinus*)

- hlavní znaky - v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy, v mládí jedlý, rychlý rozklad - autolyzace plodnic



pečárka ovčí (*Agaricus arvensis*)

- hlavní znaky - polokulovitý až ploše otevřený bílý až nažloutlý klobouk, tření i dužnina, špinavě růžově zbarvené až hnědé lupeny, blanitý závoj či třásně na okrajích klobouku



pýchavka obecná (*Lycoperdon perlatum*)

- hlavní znaky – plodnice kyjovitého až hruškovitého tvaru, v mládí je bělavá, později až světle žlutohnědá a úplně stará je olivově hnědá až šedohnědá



pestřec obecný (*Scleroderma citrinum*)

- hlavní znaky - hlízovité plodnice, gleba (vnitřek) v dospělosti modročerná



hvězdovka (*Geastrum*)

- hlavní znaky - několik protrhaných cípů, které vznikají při vývoji plodnice z vnější okrovky. Roste jich u nás několik.



hadovka smrdutá (*Phallus impudicus*)

- hlavní znaky - vajíčkovité (vejcovité) plodnice, odporně páchnoucí



Tohle je jen stručný výčet poznávacích znaků, které by na poznání u p. Jirsy měly stačit. Myslím, že stačí si to přečíst, podívat se, maximálně kouknout na něco na web. Přidám teda odkazy na použité stránky. <http://botany.upol.cz/atlas/system/index.php>, <http://houby.naturfoto.cz/>, <http://www.damyko.info/ForumA/portal.php>, <http://www.priroda.cz/>. Jinak vám přeju úspěšnou poznávačku.

Kony